

Bipacksedel: Information till användaren

Fucithalmic

1% ögonsalva, endosbehållare
fusidinsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Fucithalmic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fucithalmic
3. Hur du använder Fucithalmic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fucithalmic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fucithalmic är och vad det används för

Fusidinsyra är ett antibiotikum med bakteriedödande effekt. Fucithalmic används vid akut bindhinneinfektion orsakad av stafylokocker.

Fusidinsyra som finns i Fucithalmic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fucithalmic

Använd inte Fucithalmic

- om du är allergisk mot fusidinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Det är viktigt att du endast använder detta läkemedel enligt läkarens ordination. Felaktig användning ökar risken för antibiotikaresistens, vilket kan leda till att läkemedlet blir mindre effektivt.

Använd inte kontaktlinser medan du behandlas med detta läkemedel. Fucithalmic innehåller mikrokristaller som kan repa kontaktlinser eller hornhinnan om kontaktlinser används. Kontaktlinser kan användas igen efter avslutad behandling

Andra läkemedel och Fucithalmic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Fucithalmic kan användas under graviditet och amning

Körförmåga och användning av maskiner

Fucithalmic har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Fucithalmic kan dock ge tillfällig dimsyn efter användning. Vänta tills du återfått normal syn innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Fucithalmic

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Rekommenderad dos är en droppe två gånger dagligen.

Behandlingen bör fortsätta i två dagar efter det att symtomen har försvunnit för att undvika återkommande infektion.

Fucithalmic ögonsalva är tjockflytande, men i kombination med tårvätskan blir salvan helt klar och tunnflytande.



Bruksanvisning

Innehållet i en endosbehållare räcker till behandling av båda ögonen vid behov.

Tvätta alltid dina händer innan du använder Fucithalmic.

1. Öppna folieförpackningen genom att klippa längs den prickade linjen. Dra ut endosbehållarna ur folieförpackningen och riv av en endosbehållare. Lägg tillbaka resten av endosbehållarna och vik kanten så att folieförpackningen försluts.

2. Håll endosbehållaren med vingen nedåt. Tryck lätt på endosbehållaren för att pressa ögonsalvan till spetsen.
3. Öppna endosbehållaren genom att vrida vingen (se bild 1).
4. Stå eller sitt bekvämt och luta huvudet bakåt. Håll endosbehållaren ovanför ögat.
5. Dra försiktigt ner det undre ögonlocket och tryck ut en droppe från endosbehållaren ned i det undre ögonlocket (se bild 2).
6. Öppnad endosbehållare ska kastas omedelbart efter användning.



Användning för barn

Om detta läkemedel ska användas till ett barn kan det vara lättare att ge ögonsalvan när barnet ligger ner.

Om du har använt för stor mängd av Fucithalmic

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Fucithalmic

Om du glömmer att använda din medicin, använd den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för din nästa dos, ta inte den missade dosen utan fortsätt använda den enligt ditt vanliga schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Fucithalmic

Följ läkarens råd angående behandlingens längd. Avbryt inte behandlingen utan att först rådfråga din läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Fucithalmic och kontakta **omedelbart** läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

- Feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (allergisk reaktion) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).
- Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (angioödem) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- dimsyn (övergående)
- smärta på appliceringsstället (inklusive brännande och stickande känsla i och kring ögat)
- klåda i och kring ögat
- irritation/obehagskänsla i och kring ögat

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- svullnad kring ögonen (ödem)
- rinnande ögon
- hudutslag

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- försämring av bindhinneinflammation
- nässelutslag

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fucithalmic ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP/Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnade endosbehållare ska kasseras omedelbart efter användning.

Endosbehållare i bruten folieförpackning kasseras efter 4 veckor.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är: fusidinsyrahemihydrat motsvarande fusidinsyra 10 mg/g.

- Övriga innehållsämnen är: Karbomer, mannitol, natriumacetat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Viskös vit till off-white vattnig salva.

Förpackning med 1 x 12 endosbehållare.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irland

Tillverkare

LEO Pharma A/S, Ballerup, Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast 2018-04-19